

<b>Información de cultivo:</b>	Anémona Gemstone	Anual
<b>Nombre común:</b>	Adonis o Flor de Viento	
<b>Nombre botánico:</b>	Anémona coronaria	
<b>Semillas/gramo:</b>	1,600-2,000/gram	
<b>Temperatura óptima de germinación:</b>	15°C (Cámara)	
<b>Temperatura óptima de producción:</b>	10-24°C	
<b>pH óptimo:</b>	5,8 – 6,2 (plántula/turba) 6,0 – 7,0 (finalizar/suelo mineral)	
<b>CE – Plántula:</b>	0,26 – 0,75 mmhos/cm (1:2) / 0,76 – 2,0 (CEe)	
<b>CE – Finalizar:</b>	0,76 – 1,0 mmhos/cm (1:2) / 2,1 – 3,0 (CEe)	

## Cultivo de la plántula: 8 semanas (288 alveolos profundos)

**Etapas 1** (días 1 – 14) Sembrar semilla en una charola con 288 alveolos profundos en un sustrato con buena aeración. Colocar sin tapar en una cámara de germinación y aplicar 100 ppm de Captan\* para evitar enfermedades (damping off y botrytis). La temperatura óptima de germinación es 15°C. Proporcionar alta humedad durante todo el período de germinación, sin permitir que el medio se seque. Después de la aparición de la radícula (6-7 días), cubra ligeramente con una mezcla de turba/vermiculita y proporcione luz en la cámara. Si germina en un invernadero cubrir ligeramente con una mezcla de turba/vermiculita a la siembra y evitar temperaturas por encima de 18°C.

\*N-Trichloromethylthio-4-cyclohexene 1,2 dicarboximide

**Etapas 2** (días 15-35) Los cotiledones están completamente expandidos. Coloque las plántulas en un invernadero bien ventilado con baja humedad para evitar problemas de enfermedad. Proporcione un nivel de luz de 2.000-2.500 velas de pies/22.000-27.000 lux. La temperatura de crecimiento óptima es de 16-18°C por la noche e inferior a 24°C durante el día. Fertilizar 2-3 veces por semana a 50-75 ppm N usando una formulación bien equilibrada como 15-16-17.

**Etapas 3** (días 35-49) A medida que los tapones comienzan a llenar la charola, deje que las plantas se sequen ligeramente entre riegos para maximizar el crecimiento de las raíces. Aumente la tasa de fertilizantes a 100- 150 ppm de N según sea necesario para mantener un crecimiento saludable.

**Etapas 4** (días 50-56) Aumente el nivel de luz a 2.500-5.000 f.c./ 27.000-54.000 lux para aclimatarse antes de trasplantar en camas de flores cortados. La aplicación de fósforo suplementario en esta etapa fortalecerá el sistema radicular.

## Producción de la flor cortada: 12-14 semanas

**Trasplante:** Cuando las plántulas tienen 4-6 hojas verdaderas, están listas para trasplantar en camas de flor cortada. Tenga especial cuidado al retirar las plántulas de la charola para evitar daños en las raíces. Las anémonas responderán mejor en un suelo con buena fertilidad, alta materia orgánica y excelente drenaje. El pH óptimo en suelo mineral es 6,0-7,0.

**Espaciamento:** El espaciado recomendado es 15 cm. x 15 cm. (44 plantas por metro cuadrado).

**Fertilización:** Mantener el suelo un poco seco al principio para promover el crecimiento de nuevas raíces. Una vez que surjan nuevas raíces, aplique 150- 200 ppm N de un fertilizante líquido bien equilibrado, como 15-16-17, para promover el crecimiento saludable de las plantas. Se recomiendan aplicaciones periódicas de nitrato de calcio para fortalecer los tallos de las flores y el tejido vegetal. Riegue bien para prevenir el exceso de sales. El exceso de nitrógeno puede promover el crecimiento excesivo del follaje. Riegue temprano en el día si aplica agua a mano a través de una manguera.

**Temperatura:** Después del trasplante, establecer a 15-18°C durante una semana. A continuación, baje la temperatura a 10-13°C durante la noche y 15-18°C durante el día para un desarrollo óptimo y suficiente longitud del tallo de la flor. Idealmente, no exceda de 20°C durante el día y por debajo de 5°C de noche.

**Iluminación:** La anémona crece mejor en 38,000-65,000 lux. Aplique malla de sombra según sea necesario para reducir el exceso de calor del sol intenso. La Anémona Gemstone es día neutro, pero se desarrolla más rápido bajo fotoperiodos más largos y temperaturas más cálidas.

**Plagas:** Áfidos, trips y moscas blancas

**Enfermedades:** Botrytis, colletotrichum (rizo de la hoja), mildew veloso, pythium y rhizoctonia. Aplique agua antes de mediodía si riega a mano a través de una manguera para dejar secar el follaje antes del anochecer.

**Programación:** Siembra de julio a septiembre para florecer de enero a junio. El tiempo total de cultivo desde la siembra hasta la primera floración es de 20-22 semanas. Siembra durante todo el año en regiones ecuatoriales frescas.

**Cosecha:** Las flores deben cosecharse justo antes de su apertura. Cosecha cuando los pétalos comienzan a separarse del centro de la flor, pero no completamente abiertos.

**Poscosecha:** Mantenga los tallos en una solución de azúcar del 2-4% o solución de retención comercial para prolongar la vida de florero. Volver a cortar los tallos durante cada transferencia para prolongar la vida de florero. Mantenga las flores envueltas durante la rehidratación para obtener tallos más rectos. Almacene los tallos cortados secos a 0-1°C durante una semana. Después del acondicionamiento, almacene los tallos en una solución de retención que contenga azúcar y un germicida para mejorar la apertura de la flor. Los tallos deben almacenarse y enviarse en posición vertical. Sensible al etileno.

*“Una joya verdadera entre anémonas: Gemstone produce más de 20 flores por planta, floreciendo bajo niveles de luz bajos sin la necesidad de malla de sombra o la necesidad de desbotonar”.*

*“Toda la información dada aquí sirve solamente como guía general y debe ajustarse a las necesidades individuales. La información de cultivo está basada en las condiciones norteamericanas y Sakata no será responsable de cualquier daño de cultivos relacionados con la información proporcionada en este documento. Aplicación de reguladores de crecimiento recomendadas y los productos químicos están sujetos a regulaciones locales y estatales. Siga siempre las instrucciones de la etiqueta del fabricante. Mejor probar en algunas plantas antes de tratar toda la cosecha”.*